

HYGAIN® Safeguard EQ®

Bredverkande mykotoxinbindare

En bredverkande mykotoxinbindare i pelletsform framtagen för alla hästar – bidrar till snabb och effektiv absorption av mykotoxiner samtidigt som den minimerar hälso- och prestationsproblem.

Ingredienser

Vetekli, vetegroddar, organiska mineralföreningar och jästextrakt

Bruksanvisning

HYGAIN® SAFEGUARD EQ® kan tillsättas direkt i hästens foder. HYGAIN® SAFEGUARD EQ® doseras med 30 g per dag (uträkningen är baserad på en kroppsvikt à 450 kg).



Vad är mykotoxiner och hur påverkar de min häst?

Vissa svampar – de kan förekomma i konserverat foder/spannmål och på friska betesmarker – kan producera sekundära metaboliter som kallas mykotoxiner (eller mögelgifter). Det finns flera typer av mykotoxiner i varma och fuktiga klimat, och de interagerar med varandra – ofta i foder som inte förvarats på rätt sätt. Mykotoxiner kan såtillvida förorena foder och spannmål, och är samtidigt svåra att upptäcka eftersom de inte syns och är lukt- och smaklösa.

Hästens matsmältningssystem är känsligt för påverkan av mykotoxiner. Eftersom magsafterna inte kan bearbeta mykotoxinerna på ett effektivt sätt hamnar de i den känsliga tunntarmen och tjocktarmen. När mykotoxinerna når tjocktarmen kan de påverka tarmväggen eller passera ut i hästens blodomlopp, vilket kan leda till kliniska symptom, som exempelvis andnings- och tarmbesvär, neurologiska problem i allmänhet och problem med fortplantningen.

Symptom associerade med förekomst av mykotoxiner i hästens foder är ofta ospecifika, men följande kliniska iakttaganden kan göras (märk att under vissa omständigheter kan mögelgifter till och med leda till dödsfall):

- dålig form (viktninskning)
- försämrad prestation
- slöhet
- håglöshet
- försämrad aptit
- försämrad rörlighet/hälta
- andningssjukdomar
- mag-tarmsjukdomar (t.ex. kolik)
- fortplantningsproblem
- neurologiska sjukdomstillstånd (t.ex. neurotoxicitet, dödlig leukoencefalomalaci och ataxi)
- försämrat immunförsvar
- atypisk myopati (muskelsjukdom)

Varför använda HYGAIN® SAFEGUARD EQ®?

Foderanalyser (för att påvisa mykotoxiner i foderstaten) är dyra att göra, och det kan vara svårt att utesluta mögelgifter helt. För att undvika föroreningar bör allt foder och tillskott noga inspekteras efter tecken på mögel. På grund av svårigheten att förutse förekomst av mykotoxiner rekommenderar vi att du tillsätter en bredverkande mykotoxinbindare i din hästs foderstat, som enkelt binder mykotoxinerna och leder dem igenom matsmältningsorganen och ut med avföringen – utan att hästen tar skada.